

PHÂN TÍCH GỘP FARSANG

Kết quả từ phân tích hậu kiểm, tổng hợp từ 4 nghiên cứu quan sát:
FORTISSIMO, FORSAGE, ACES, PICASSO.

Được đăng tải trên tạp chí **Advance in Therapy** công bố 2021

LỢI ÍCH CỦA VIÊN PHỐI HỢP LIỀU CỐ ĐỊNH PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KÈM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 VÀ/HOẶC BÉO PHÌ HOẶC CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Mục tiêu

Đánh giá tác động của viên phối hợp Perindopril/Indapamide qua phân tích tổng hợp từ 4 nghiên cứu quan sát.



- ✓ FORTISSIMO
- ✓ FORSAGE
- ✓ ACES
- ✓ PICASSO

Đối tượng bệnh nhân

- Huyết áp trung bình **162/94** mmHg
- Độ tuổi **61 ± 12** tuổi
- Thời gian tăng huyết áp **11 ± 8** năm
- Đái tháo đường type 2 (21%)**
- Béo phì (49%)
- Hội chứng chuyển hóa (27%)

PHƯƠNG PHÁP


✓ Phân tích hậu kiểm tổng hợp dữ liệu từ 4 nghiên cứu quan sát.

✓ Hầu hết bệnh nhân **đã điều trị nhưng chưa kiểm soát huyết áp** được chuyển sang viên phối hợp liều cố định Perindopril/Indapamide (10 mg/ 2.5 mg).

✓ Huyết áp được đo tại thời điểm: ban đầu, 1 tháng và 3 tháng.


KẾT QUẢ

Sau 3 tháng, huyết áp tâm thu trung bình giảm 30 mmHg



Hiệu quả giảm huyết áp của

Perindopril/Indapamide tỷ lệ thuận mức độ tăng huyết áp¹



Viên phối hợp Perindopril/Indapamide an toàn và dung nạp tốt với tỷ lệ tác dụng phụ thấp


Sau 3 tháng ghi nhận:

Tỷ lệ biến cố bất lợi



1.3%

Ho



0.3%

Rối loạn điện giải



Không ghi nhận

Sự thay đổi chỉ số sinh hóa

	Ban đầu	Sự thay đổi sau 3 tháng
Na ⁺ (mmol/l)	139.9 ± 5.9	-0.3 ± 4.8
K ⁺ (mmol/l)	4.4 ± 0.8	0.0 ± 1.0
Glucose (mmol/l)	5.9 ± 1.6	-0.3 ± 1.0
Cholesterol (mmol/l)	5.8 ± 1.1	-0.6 ± 0.9
Acid uric (μmol/l)	311.0 ± 85.3	-14.3 ± 58.7

Nồng độ Na⁺, K⁺, glucose, cholesterol, acid uric trong huyết thanh giữ ở mức ổn định sau 3 tháng.

KẾT LUẬN²

Kết quả phân tích hậu kiểm trên những nghiên cứu có cỡ mẫu lớn (16,763 bệnh nhân) đã cho thấy phối hợp Perindopril/Indapamide:

- Giúp **70% bệnh nhân** chưa kiểm soát huyết áp trước đó đạt huyết áp mục tiêu sau 3 tháng.
- Kiểm soát huyết áp **hiệu quả bất kể mức độ tăng huyết áp** trên nhóm bệnh nhân khó kiểm soát huyết áp.
- **An toàn và dung nạp tốt** với tỷ lệ tác dụng phụ thấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Dézsi CA, Glezer M, Karpov Y, Brzozowska-Villatte R, Farsang C. Effectiveness of Perindopril/Indapamide Single-Pill Combination in Uncontrolled Patients with Hypertension: A Pooled Analysis of the FORTISSIMO, FORSAGE, ACES and PICASSO Observational Studies. Adv Ther. 2021 Jan;38(1):479-494; 2. Farsang C, Dézsi CA, Brzozowska-Villatte R, De Champvallins M, Glezer M, Karpov Y. Beneficial Effects of a Perindopril/Indapamide Single-Pill Combination in Hypertensive Patients with Diabetes and/or Obesity or Metabolic Syndrome: A Post Hoc Pooled Analysis of Four Observational Studies. Adv Ther. 2021 Apr;38(4):1776-1790.

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC


Chịu trách nhiệm xuất bản: xxxxxxxx | Chịu trách nhiệm nội dung: xxxxxxxx.

Biên tập: xxx. | Sửa bản in: xxx. | Thiết kế: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

In xxx bản, khổ 21x29,7cm tại Công ty Cổ phần Hưng Việt, địa chỉ: 460 Trần Quý - Đống Đa - Hà Nội.

Số xác nhận đăng ký xuất bản: xxxx. Quyết định xuất bản số: xxxx.

In xong và nộp lưu chiểu năm xxxx. Mã số sách chuẩn quốc tế - ISBN: xxxx.



8 | 563146 | 029856 |

"KHÔNG BÁN"

HEDIMA

Đối tác liên kết xuất bản:
Công ty TNHH HEDIMA